

Aus der Psychiatrischen und Nervenlinik der Universität Jena.

Direktor: Professor Dr. Berger.

Unfall oder Hirntumor?

Ein Beitrag zur Unfallbegutachtung.

Inaugural-Differtation

zur


Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Friedrich Schiller-Universität Jena.



Vorgelegt von

Gerhard Webendörfer

aus Schleiz/Thür.

1 9 3 7.

Druck: Kuppe, Reitzenstein & Helmrich, Schleiz/Thür.

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät der
Friedrich-Schiller-Universität, Jena

Gutachter: Prof. Berger

Jena, den 18. Dezember 1936.

B u h t z, Dekan.

Meinen lieben Eltern.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Unfall oder Hirntumor?

Ein Beitrag zur Unfallbegutachtung.

I. Der Unfall:

- a) Der Unfallbegriff.
- b) Ursachen des Unfalls.
- c) Unfallfolgen.

II. Eigener Fall:

- a) Anamnese.
- b) Befund bei der Aufnahme.
- c) Verlauf.
- d) Sektionsbefund.

III. Epikrise:

- a) Intrakranielle Blutungen: Unfallursache oder Unfallfolge.
- b) Unfallbegutachtung.

IV. Schlußfolgerung:

Aufgaben des begutachtenden Arztes.

Das Frageproblem, Unfall oder Hirntumor, wird in folgender Arbeit hauptsächlich vom Standpunkt des Gutachters aus behandelt. An Hand eines Falles der Psychiatrischen- und Nervenlinik Jena soll gezeigt werden, auf welche Schwierigkeiten eine gerechte gutachtliche Beurteilung stößt, wenn eine richtige Diagnosfeststellung durch verschiedene differentialdiagnostische Möglichkeiten besonders erschwert wird.

I. Der Unfall.

a) Der Unfallbegriff.

Wenn wir eine Erklärung des Unfallbegriffs im medizinischen Sinne geben wollen, wie er für die Arbeiterversicherung Voraussetzung ist, so können wir das Gesetz dazu nicht heranziehen, da dort die Fragestellung zu dem Begriff »Unfall« zunächst eine rein juristische ist. Die Definition des Begriffs »Unfall« liegt in der Beantwortung der Frage, ob überhaupt ein Betriebsunfall vorliegt oder nicht, und sie gilt sowohl für die medizinische wie auch für die juristische Betrachtung.

Voraussetzung für die Entschädigungspflicht der Arbeiterversicherung ist, daß:

1. der Betroffene entweder durch eine äußere Verletzung oder durch eine organische Erkrankung eine Schädigung seiner körperlichen oder geistigen Gesundheit — Körperverletzung oder Tod — erleidet.

2. die Schädigung auf ein plötzliches, d. h. in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum eingeschlossenes Ereignis zurückzuführen ist, welches in seinen Folgen den Tod oder die Körperverletzung verursacht hat.

3. der »Unfall« bei dem Betriebe eingetreten ist. Erforderlich ist also nicht nur die Ausübung der Betriebstätigkeit, sondern auch ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Tätigkeit und diesem Unfall. Der Versicherte muß einer Gefahr erliegen, der er durch seine Betriebstätigkeit ausgesetzt war.

Zusammenfassend können wir feststellen: Ein Unfall ist eine plötzliche, während der Arbeit entstandene Gesundheitsschädigung.

Von den das Gesetz näher erklärenden Bestimmungen über den Unfallbegriff scheint mir medizinisch besonders wichtig, daß z. B. der Weg von und zur Arbeitsstätte im allgemeinen nicht als versichert gilt. Der Unfall braucht auch nicht die einzige Ursache der Gesundheitschädigung zu sein, denn die Gesundheitsstörung wird auch dann entschädigt, wenn der angegebene Unfall als wesentliche Teilursache für die Herbeiführung der Schädigung herangezogen werden kann. In den Gesetzesausführungsbestimmungen wird weiter darauf hingewiesen, daß nicht nur die direkten, sondern auch die indirekten, d. h. mittelbaren Unfallfolgen unter die Entschädigungspflicht der Versicherung fallen.

Begreiflicherweise wird ein Großteil der Verunfallten zunächst versuchen, die »Erkrankung« als versicherungspflichtig hinzustellen. Daraus ergibt sich für den Begutachter die wichtige Forderung, den Unfallhergang unbedingt klarzustellen; d. h. er muß entscheiden, was sich nach dem Bericht der Verletzten tatsächlich ereignet hat und auch ereignen konnte. Der Gutachter muß sich über die Möglichkeit des Zusammenhanges zwischen Erkrankung und angeblichem Unfall Klarheit schaffen, um die angegebene oder tatsächlich bestehende Gesundheitschädigung auf einen Unfall zurückführen zu können.

Es ist deswegen für den Gutachter unerläßlich, daß er sich mit den Ursachen des Unfalls genau vertraut macht.

b) Ursachen des Unfalls.

Bei der Behandlung der Frage nach den Ursachen, die zu einem Unfall führen können, stehen sich zwei große Gruppen von Krankheiten gegenüber: solche, die durch äußere Einflüsse zustande kommen und einen gefunden Menschen treffen, und solche, die durch innere Veranlagung verursacht sind, für die der »Unfall« also nur auslösendes Ereignis ist.

Bei den ersteren stellen wir mit Reichhardt fest: »Den konstitutionell vollkommen gefunden Menschen trifft eine äußere Schädlichkeit. Diese kann einmalig oder chronisch sein, wobei jedoch nur die einmaligen, äußeren Krankheitsursachen unter den Begriff »Unfall« zu rechnen sind, während die Krankheiten infolge chronisch äußerlicher Schädlichkeiten vielleicht Berufs- oder Gewerbekrankheiten sind.«

Bei den traumatischen akuten oder chronischen Schädigungen wird meistens der lokale Befund mit seinen Symptomen im Vordergrund stehen und es dem Gutachter ermöglichen, eine klare Entscheidung zu treffen. »Auch hier wird stets zu

bedenken fein, daß eine einmalige äußere Einwirkung erheblich und dauernd schädigen soll, um als Unfall anerkannt zu werden; dazu muß diese selbst schon eine recht starke sein und dementstprechend auch unverkennbare, akute Symptome hervorrufen.« (Reichhardt).*

Zu diesen Krankheiten, die durch äußere Schädigung entstanden sind, rechnen ferner die akuten Infektionen und Vergiftungen; sie müssen jedoch eine besonders genaue Klärung erfahren, z. B.: eine langanhaltende Kälteeinwirkung wird nicht als Unfall anzusehen sein, sondern höchstens eine akute Erkältung mit akuten Symptomen, die in den nächsten Stunden auftreten, kann in diesem Sinne für bestimmte Krankheitsbilder (Nierenschädigungen) in Betracht kommen. Schwierigkeiten in der Beurteilung erwachsen aber dann, wenn zwischen äußerer Krankheitsursache und innerer Veranlagung eine Verbindung, eine Abhängigkeit besteht, wie z. B. bei der Epilepsie. Hier kann unter Umständen von der unfallgutachtlichen Entscheidung, daß besagter Unfall keine traumatische Epilepsie hervorrufen konnte, neben der Entschädigungsfrage noch die weit schwerwiegendere, erbgesundheitsliche Beurteilung abhängen.

Waren bisher einmalige oder häufigere Ereignisse Ursachen des Unfalls, so fehlt dieses Moment bei der zweiten Gruppe, den endogen bedingten Krankheiten. Sie stellen den Gutachter durch die Frage: liegt hier tatsächlich ein Unfall vor, oder handelt es sich nur um eine zufällig unter diesem Erscheinungsbild ausgebrochene innere Erkrankung, oft vor nicht leicht zu lösende Aufgaben. Zwischen inneren und äußeren Ursachen ist scharf zu trennen, da nicht jede Krankheit eine äußere Ursache haben muß. Es scheint oft so, daß der Versicherte aus voller Gesundheit heraus erkrankt und ein harmloses äußeres Betriebsereignis dafür als Ursache heranzieht, während tatsächlich der Ausbruch der Erkrankung auch ohne die Tätigkeit im Betriebe, bei einer privaten, häuslichen Beschäftigung ebenso erfolgen konnte. In diesem Sinne begünstigend wirken die Konstitutionskrankheiten. Ein Diabetes mellitus oder eine endogen bedingte Adipositas mit ihrer starken Kreislaufbelastung können z. B. im vorgeschrittenen Stadium zur Kreislaufschwäche führen, ohne daß körperliche Überanstrengung im Sinne einer wesentlichen Teilursache vorliegt. Doch ist man gerade bei solchen und ähnlichen Fällen leicht geneigt, irgend ein äußeres Ereignis als auslösende Ursache anzuerkennen. Ähnlich liegt es bei Abnützungserrscheinungen, die bei schwacher körperlicher Veranlagung auftreten. Eine vorzeitige Arteriosklerose braucht bis zum Auftreten von Herdererscheinungen im

Gehirn keine Erscheinungen gemacht zu haben. Doch wird es besonders sorgfältiger Untersuchung bedürfen, um einwandfrei behaupten zu können, die Symptome rührten von einer im medizinischen Sinne harmlosen Kopfverletzung her und nicht von einer Praefklrose.

Diese kurzen Beispiele sollen beweisen, wie wenig sich allgemein gültige Regeln aufstellen lassen für die Beurteilung des Zusammenhangs zwischen Unfallursache und Krankheit. Eine sachgemäße und gerechte Entscheidung ist stets auf den Einzelfall zu beziehen und nur bei Berücksichtigung und richtiger Würdigung aller Einzelheiten möglich. Das gleiche gilt für die Unfallfolgen, da der Gutachter hier die schwere Entscheidung zu treffen hat: Ist der bestehende Krankheitszustand tatsächlich die Folge des stattgehabten Unfalls oder nicht?

c) Unfallfolgen.

Bei der Betrachtung der Unfallfolgen beschränke ich mich auf die des Gehirns, entstanden durch traumatische Schädlichkeiten. Als erste sei die Hirnerschütterung in ihren verschiedenen Formen einer näheren Würdigung unterzogen. Coenen gibt folgende Begriffserklärung: »Die Hirnerschütterung besteht in einer vorübergehenden traumatischen Schädigung des Gehirns und ist eine augenblickliche Folge einer heftigen, kurzen, stumpfen Gewalteinwirkung auf den Schädel, deren führendes Symptom die Bewußtlosigkeit ist. Der Schädel braucht dabei nicht verletzt zu sein.« Damit ist klar zum Ausdruck gebracht, daß beim Fehlen des Kardinalsymptoms der Bewußtlosigkeit eine Hirnerschütterung unbedingt auszuschließen ist. Im anderen Fall kann aus der Länge der Bewußtlosigkeit auf die Schwere geschlossen werden. Nach Reichhardt entstehen die Hirnerschütterungssymptome meistens beim Fallen auf den Hinterkopf. Wahrscheinlich wird dem Beharrungsvermögen entsprechend das Gehirn besonders heftig gegen die innere Wand des Hinterhauptschädels geschleudert, und dabei kommt es durch Contrecoup-Wirkung oft zur Mitbeteiligung des verlängerten Markes und des Rautenhirns. Darauf weisen uns dann die Symptome von Seiten der vegetativen Zentren in der Medulla oblongata hin: Erbrechen, oberflächliche Atmung und, was besonders wichtig ist, Pulsanomalien, ausgelöst durch Vagusreizung. Durch die Erfahrungstatsache, daß bei Hirnerschütterungen sowohl die objektiven, wie auch die subjektiven Symptome kurz nach dem Unfall am stärksten sind, dann allmählich abklingen, wird die Diagnose »Hirnerschütterung« noch gefestigt.

Häufig wird das letzte Krankheitsbild nicht klar zu Tage treten, und es bestehen fließende Übergänge zur *Compressio cerebri*. Hierbei hat das Schädeltrauma zu Blutungen in die Schädelkapsel, zwischen die Hirnhäute oder in das Gehirn hinein geführt, und durch das entstandene Mißverhältnis zwischen Schädelraum und Inhalt kann das Gehirn dem dadurch erhöhten Druck nicht mehr ausweichen.

Der allgemeine Hirndruck, eingeleitet durch cerebrale Erscheinungen, wie Kopfschmerz, Schwindel, Unruhe, Irrereden, Schlaffucht und Erbrechen, wird unter Umständen durch vier Kardinalsymptome beherrscht: Druckpuls mit Stauungspapille, Cheyne-Stokes'sche Atmung, tiefe Bewußtlosigkeit und erhöhten Lumbaldruck. Wegen der Möglichkeit der kompensatorischen Flüssigkeitsverschiebung im Schädelinneren brauchen Hirndrucksymptome nicht gleich nach dem Trauma aufzutreten, es vergehen oft Stunden, ja Tage — das sogenannte freie Intervall — wodurch wir zur Unterscheidung von akutem und chronischem Hirndruck kommen. Die dritte und schwerste Form der Hirnschädigung ist die *Contusio cerebri*, die bei geschlossener Schädelkapsel zu einer Zerstörung von Gehirnteilen durch Quetschung führt. Entsprechend dem Ort der Gewalteinwirkung treten hier meistens Herdsymptome in Erscheinung, sofern nicht stumme Regionen getroffen sind. Die Symptome treten sofort auf und nehmen gewöhnlich mit der Stärke des auftretenden Hirnoedems zu. Da die Schädigung gewöhnlich multipel und mit *Commotio* oder *Compressio cerebri* verbunden ist, wird die Diagnose nicht immer klar sein. Entscheidend für die Diagnose »*Contusio cerebri*« ist in solchen Fällen der Blutbefund im Liquor.

Abschließend soll noch kurz auf die im Kriege öfters beobachtete Erschütterung des Rückenmarks eingegangen werden. Die Befestigung des Rückenmarks an seinen vorderen und hinteren Wurzeln wird noch vervollständigt durch die Verbindung mit den Rückenmarkshäuten, während der Liquor das gesamte Gewicht trägt. Grobe Schädigungen im Sinne einer Blutung, einer Quetschung mit Erweichung oder einer lokalen Zertrümmerung führen zu den charakteristischen Symptomen der Rückenmarksschädigung.

Waren die bisher erörterten Schädigungen des Gehirns durch Traumen auf den unverletzten, knöchernen Schädel erfolgt, so sollen nun die Gewalteinwirkungen angeführt werden, die zu einer Zertrümmerung des Schädels, zu Schädelbrüchen, führen. Auch hier müssen wir unterteilen in Schädelfrakturen:

1. mit oder ohne Verletzung der äußeren Weichteile,

2. mit oder ohne Hirnerschütterung,

3. mit und ohne traumatische Hirnverletzung.

Unsere Diagnose gründet sich dieser Einteilung entsprechend zunächst auf die Inspektion; wir finden charakteristische Blutunterlaufungen und Blutstänkungen, die unter der Haut des Gesichts, Nackens, Halses und den Schleimhäuten des Mundes sichtbar werden. Sie lassen in Verbindung mit Ausfluß von Blut, Liquor oder selbst zertrümmerter Gehirnmasse aus Nase, Mund und Ohr stets an eine Fraktur des Schädels, besonders der Basis, denken. Treten zu diesen Symptomen noch Funktionsstörungen der Hirnnerven, bezw. vollständige Lähmungen, so wird die Erkrankung besonders erschwert. Nicht immer wird sich allerdings ein so klares Bild ergeben, sodaß uns erst die Röntgen-Aufnahme über die verschiedenen Arten von Brüchen und ihrer Lage Aufschluß geben muß. Neben diesen Symptomen werden sich stets mehr oder minder starke Allgemeinerkrankungen nachweisen lassen, z. B. finden wir wohl ausnahmslos bei ausgedehnten Schädelbasisbrüchen die Symptome einer verschieden starken Hirnerschütterung und Hirnquetschung.

Vom Standpunkt des Gutachters ist vor allem zu beachten, daß der Schädelbruch von der traumatischen Schädigung der Hirnnerven oder des Gehirns selbst zu unterscheiden ist. Denn die vollständige Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit wird kaum in Frage gestellt, wenn es sich um einen einfachen Schädelbruch handelt. Kommen aber traumatische Schädigungen des Gehirns oder seiner Nerven hinzu, so ist dem eine viel schwerwiegendere Bedeutung beizumessen.

Wenden wir uns den traumatischen Schädigungen bei endogenen Hirnerkrankungen zu, soweit sie differentialdiagnostisch im Rahmen dieser Arbeit von Bedeutung sind, so ist allgemein festzustellen, daß ein Unfall hierbei nur eine wesentliche Teilursache — nur darum kann es sich bei endogenbedingten Krankheiten handeln — für die Entstehung oder Verschlimmerung einer Anzahl von organischen Hirnerkrankungen sein kann. Dabei sind die Möglichkeit des zeitlichen Zusammenhangs und heftige akute Hirnsymptome Voraussetzung.

Betrachten wir von diesem Gesichtspunkt die bösartigen Geschwülste, so können wir sagen, daß maligne Tumoren zur Entstehung und zum Wachstum keine äußere Ursache brauchen; immerhin wäre es denkbar, daß Traumen eine Mobilisierung der bis dahin schlummernden Geschwulstzellen und ihrer Wachstumsenergie bewirken (Marburg, Reichhardt). Um diese Möglichkeit jedoch als Unfall anerkennen zu können, bedarf es einer Ursache, die sofort objektive Verletzungsfolgen hinterläßt

und einer »Inkubationszeit«, in der die glaubhaften Beschwerden wieder verschwinden können, nach der aber dann typische Geschwulstbeschwerden auftreten müssen. Ich glaube, daß eine wesentliche Mitwirkung des Unfalls meistens ausgeschlossen werden kann, und daß es sich dann höchstens um eine auslösende Gelegenheitsursache handelt. Es ist doch so, daß ein latent geschwulstkrankes Gehirn gegen äußere Einwirkungen sehr empfindlich ist, namentlich, wenn die Geschwulst in der Gegend der vierten Hirnkammer sitzt (Reichhardt). Ein unerhebliches Kopftrauma, selbst eine rasche Kopfbewegung kann durch Rupturierung eines Gefäßes in der Geschwulst schwerste Symptome hervorrufen. Von einer erheblichen Teilursache ist aber dann nicht mehr zu sprechen, da dieselben Erscheinungen ja aus inneren Gründen (akutes Wachstum, Vermehrung des Liquors) hervorgerufen werden können. In diesem Falle werden genaueste anamnestische Erhebungen für die Zeit vor dem »Unfall« nicht selten zur Sicherung der Diagnose beitragen. Kopfschmerz, Schwindel, Erbrechen, eventuell bei Lageveränderung Taumeln, schlechtes Sehen und Gedächtnisstörungen werden zwar selten fehlen, sind aber allein nicht beweisend für einen Tumor cerebri. Erst die bestehende Stauungspapille, die Pulsverlangsamung und der erhöhte Druck der Spinalflüssigkeit mit etwaigem zytologischen Befund und positiven Kolloidreaktionen, die cerebralen und cerebellaren Herderscheinungen (epileptiforme Anfälle) und nicht zuletzt Störungen von Seiten der Psyche sichern die Diagnose.

Bei Hirnschädigungen, die vom Versicherten wohl meistens auf ein Kopftrauma bezogen werden, ist auch an die Schlagaderverhärtung des Gehirns zu denken. Ursachen hierfür sind konstitutioneller, also endogener Natur, z. B. Diabetes mellitus oder Gicht, oder sie beruhen auf chronisch endogenen Schädigungen, die aber einen Menschen treffen, der durch seine angeborene Veranlagung besonders empfänglich ist, z. B. für anhaltende starke körperliche oder geistige Überanstrengung.

Wenn die traumatische Hirnslagaderverhärtung als Unfall anerkannt werden soll, so muß das übrige Blutgefäßsystem frei von Verhärtungen sein. Eine umschriebene Schädigung am Gefäßnetz (Aneurysma, Nekrose) durch Trauma ist wohl denkbar, doch wird das stets mit schweren Organschädigungen einhergehen.

Es muß für die Diagnose »traumatische Arteriosklerosis cerebri« nach sorgfältiger Untersuchung der übrigen Organe (Blutdruck etc.) erstens eine allgemeine Arteriosklerose ausgeschlossen werden können und zweitens für die Entstehung nach dem Unfall der zeitliche Zusammenhang, die wesentliche

Teilursache und die akuten Hirnsymptome vorhanden gewesen sein. Gewöhnlich wird es sich um apoplektiforme bzw. epileptiforme Bilder handeln, soweit es sich um ein akutes Auftreten handelt. Schwindeln, Flimmern vor den Augen, Ohrensausen, Paraesthesen beherrschen das Krankheitsbild. Bei allmählicher Entwicklung bilden Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Vergeßlichkeit, Reizbarkeit und Abnahme der geistigen Regsamkeit und Leistungsfähigkeit die ersten Symptome.

Ähnlich verhält es sich mit dem Krankheitsbild der Lues cerebri, an die bei Hirnerkrankungen der mittleren Jahre ebenfalls gedacht werden muß. Die Wassermannsche Seroreaktion wird zwar häufig Klarheit bringen, doch beweist ihr negativer Ausfall nicht unbedingt das Gegenteil. Bei der rein gummösen Form der Lues cerebri handelt sich es meistens um somatische und vor allem um psychische Zustandsbilder, wie beim Tumor cerebri, während bei der arteriosklerotischen Form die Krankheitserscheinungen mehr der Arteriosklerosis cerebri ähneln. Allgemein ist zu sagen, daß im Sekundärstadium der Lues hauptsächlich meningitische Reizercheinungen vorherrschen, aber gelegentlich auch paranoide und katatonische Zustandsbilder in Erscheinung treten. Cerebrale Herdererscheinungen mit Symptomen, die sich je nach dem Sitz derluetischen Prozesse richten, sind mehr im Tertiärstadium vorhanden. Für unsere Betrachtungen ist bestimmend, daß traumatische Hirnlues dann als wesentliche Teilursache anerkannt wird, wenn eine schwer organische Hirnschädigung, z. B. schwere Commotio oder dauernde traumatische Hirnschädigung, vorgelegen hat, und wenn sich die zeitliche Entwicklung in der möglichen Grenze hält (Reichhardt).

Nachdem durch die Schilderung einiger Krankheitsbilder darauf hingewiesen werden konnte, wie schwer eine gutachtliche Entscheidung oftmals ist, — weil die Diagnosestellung der exogenen und endogenen Nervenkrankheiten, die in bestimmten Abschnitten ihres Verlaufes viel Verwandtes haben und darum leicht zu Fehldiagnosen führen, zuweilen schwer oder gar unmöglich ist, — soll im folgenden nun ein Fall der Psychiatrien und Nervenlinik zu Jena angeführt werden, dessen klinische Diagnose lautete: »Schädelbasisfraktur, intracranielle Blutungen«, und bei dem die Sektion eine diffuse Karzinose des Gehirns ergab.

II. Eigener Fall.

a) A n a m n e s e.

Josef M., Analytiker, 44 Jahre alt, am 14. 12. 1934 der Klinik mit dem Verdacht auf Kleinhirnbrückenwinkeltumor überwiesen; gestorben am 13. 1. 1935. Familienanamnese o. B., ebenso eigner Lebenslauf bis auf Magenbeschwerden in den letzten Jahren, derentwegen er Anfang 1934 in Kissingen zur Kur weilte. Seitdem beschwerdefrei. Venerische Infektionen werden abgelehnt; kein Alkohol- und Nikotinabusus. Die begleitende Ehefrau gibt zur Vorgeschichte folgendes an: am 1. 11. 1934 sei ihr Mann im Betriebe auf der Treppe ausgerutscht und rücklings mit Nacken und Rücken auf eine Treppenstufe aufgeschlagen; danach keine Bewußtlosigkeit, Blutungen oder Erbrechen. Er stand auf und arbeitete weiter. Nach 2 bis 3 Tagen stellte sich Kältegefühl im rechten Arm ein; daraufhin ging er zum Arzt. 14 Tage später (14. 11. 34) plötzlicher Ohnmachtsanfall bei der Arbeit, nachdem er am Abend vorher eine Kopfdusche genommen hatte. Er brach bewußtlos zusammen und fiel mit dem Hinterkopf auf die Steinfliesen. Dabei trug er eine Schwellung am Hinterkopf davon und mußte sich zu Bett legen; es habe sich eine Lähmung der Muskeln des linken Auges eingestellt: das Auge sah nach innen. Stuhlgang und Wasserlassen waren erschwert. Patient mußte katheterisiert werden. Die Sprache war anfangs »verschwunden«, kehrte aber leidlich wieder. Er war nicht schläfrig, aber schwach gewesen. Aus Nase und Mund sei Blut ausgetreten, auch habe er über Druckgefühl auf beiden Ohren geklagt.

Aus den Akten der Berufsgenossenschaft, dem Bericht des Nervenarztes und dem des auswärtigen Krankenhauses können wir folgende objektive Anamnese erheben:

Zur Vorgeschichte: Patient hat sich im Januar 1934 wegen Kopfneuralgien behandeln lassen.

Am 1. 11. 1934 stürzte er im Betriebe rücklings auf die Umfassungsmauer einer Treppe; er fühlte sich danach zwar nicht erwerbsunfähig krank, begab sich aber am nächsten Tag in die Behandlung eines praktischen Arztes, der Prellungen an der rechten Rückenseite unterhalb des Rückgrates feststellte. Der Vorfall wurde der Firma am 7. 11. 34 gemeldet. 2 bis 3 Tage nach dem Unfall stellten sich aber noch Taubheit im rechten Arm, Schläfenschmerzen und Schwindel ein; der zugezogene Nervenpezialist konnte Fazialisparese links und Abweichen der Zunge nach links als objektiven Befund nachweisen.

Nach 14 Tagen (14. 11. 34) plötzliches Unwohlsein bei der Arbeit; Patient fällt um, als er sich auf einen Stuhl setzen will. Nach seinen Angaben — der Bericht des Krankenhauses spricht von retrograder Amnesie — soll er für längere Zeit bewußtlos gewesen sein, während in den Akten der Berufsgenossenschaft ausdrücklich betont ist, »er fiel um, ohne das Bewußtsein verloren zu haben«. Auf Wunsch der Angehörigen erfolgte zunächst Aufnahme in einem auswärtigen Krankenhaus, dessen Bericht zum zweiten Sturz befragt: »Am 14. 11. 34 Sturz während der Arbeit. Bewußtlosigkeit und Erbrechen. Retrograde Amnesie. Verschlimmerung des Zustandes, Fazialislähmung links und Blasenlähmung. Lidßchluß links nicht möglich, linker Mundwinkel hängt. Stehen nicht möglich, Sehnenreflexe normal, Sensibilität am rechten Arm herabgesetzt. Gefühl für spitz und stumpf überall erhalten. Angaben verlangsamt und zögernd. Überweisung mit dem Verdacht auf Kleinhirnbrückenwinkel-tumor oder Haematom«.

b) Befund bei der Aufnahme.

Es handelt sich um einen kleinen, zart gebauten Mann von 163 cm Körpergröße, in mäßigem Ernährungszustand. Haut und sichtbare Schleimhäute sind genügend durchblutet. Rachenorgane o. B. An den inneren Organen, insbesondere Herz und Lungen, findet sich kein krankhafter Befund. Der Puls ist mittelkräftig, genügend gefüllt und regelmäßig. 60 Schläge pro Minute, Blutdruck 130/90 mm Hg. Bauchorgane o. B. Blase ist mäßig gefüllt. Alte Appendektomienarbe.

Drüenschwellungen waren nicht festzustellen, keine Oedeme, Cyanose oder Dyspnoe, Stuhlgang und Wasserlassen erschwert. Patient muß katheterisiert werden. Urin zeigt: Eiweiß: Spur. Zucker: positiv. Sediment: zahlreiche rote und weiße Blutkörperchen. Blutsenkungsgeschwindigkeit: 16:32:66 nach Westergreen. WaR: im Blut und im Liquor negativ. Liquordruck: 60 mm Wasser, Pandy: positiv, Nonne-Apelt und Weichbrodt: negativ, $\frac{1}{3}$ Zellen, keine pathologischen Formbestandteile im Sediment. Die Spinalflüssigkeit zeigt Xanthochromie. Blutbild: 9400 Leukocyten, sonst normal.

Nervensystem: Anconaeusphaenomen beiderseits gleich, Radiusperiotreflex normal, Kniephaenomen links stärker als rechts, links ist der Babinski verdächtig. Achilles-, Plantar-sehnenreflexe normal. Es fanden sich keine Kloni. Die Bauchdeckenreflexe fehlen gänzlich. Im Bereich des rechten Armes und der rechten Schultergegend ist das Gefühl für Berührung,

das Unterscheidungsvermögen für spitz und stumpf und für warm und kalt herabgesetzt, allerdings mit sehr wechselndem Befund. Der Kopf ist nach allen Richtungen aktiv und passiv frei beweglich. Keine Klopfempfindlichkeit; nur die Austrittsstelle des N. occipitalis ist wenig druckempfindlich. Keine Geschwulstbildung am Kopf zu erkennen.

Arm- und Beinbewegungen sind frei und koordiniert; Gang ist ausgesprochen taumelnd und schwankend. Romberg positiv. Das Auswärtssehen der Augen ist nach beiden Seiten behindert; nach links mehr als nach rechts. Feinschlägiger Nystagmus nach links, nach rechts grobe Zuckungen. Pupillen mittelweit, rund; rechts weiter als links. Lichtreaktion verzögert und sehr wenig ergiebig. Convergenzreaktion intakt. Conjunktivalreflex fehlt beiderseits, Cornealreflex links nur sehr schwach auslösbar. Augenhintergrund o. B. Am linken Auge zeigt sich Lagophthalmus, auch der linke Mundfazialis kann nicht innerviert werden, der Stirnast nur wenig. Die Zunge weicht nach links ab, kein Zittern, Gaumensegel wurde symmetrisch gehoben; Sprachartikulation ist nicht gestört. Geruch und Gehör sind intakt. Röntgen-Aufnahme des Schädels o. B., keine Temperaturen.

Psychisch macht der Patient bei der Aufnahme einen müden und leicht benommenen Eindruck. Er gibt zwar richtig Auskunft, ist auch orientiert, zeigt aber Wortfindungsstörungen. Er klagt vor allem über Flimmern vor den Augen und Doppelsehen. Sein Gedächtnis habe gelitten seit seinem letzten Sturz, und seine Gedanken gingen schwer. Er werde auch seit einer Woche das Wasser nicht mehr los. Im wesentlichen bestätigt er die Angaben seiner Frau und fügt noch hinzu, daß er unmittelbar nach dem zweiten Sturz einen Tag lang bewußtlos gewesen sei. Nach dem Aufwachen habe er Übelkeit und Schwindelgefühl verspürt; er habe auch gebrochen. Später gibt er an, die Bewußtlosigkeit habe nur vorübergehend bestanden; das übrige sei nur ein Hindämmern gewesen.

c) Verlauf.

In den folgenden Tagen nach der Einlieferung entwickelt sich nach anfänglicher Besserung das Bild der typischen amnestischen Aphasie. Der Patient muß täglich katheterisiert werden. Die vorsichtig ausgeführte Lumbalpunktion ergibt Xanthochromie. Am 18. 12. 34: Patient fühlt sich wohler, nur noch schwache Andeutung von aphasischen Störungen.

Am 27. 12. 34: Patient ist stark benommen und nicht zu fixieren. Motorische Unruhe, starker Singultus, Aphasie

wechselnd. Am 5. 1. 35: Nach anfänglicher Besserung verschlechtert sich der Zustand des Patienten jetzt ständig; nachts sehr unruhig. Muß gefüttert werden. Entleert Urin manchmal spontan, meistens unsauber mit Stuhl und Urin.

Am 9. 1. 35: Schluckstörungen treten auf; er vermag nur noch flüssig-breitige Nahrung zu sich zu nehmen. Stets unruhig, weinerlich. Kommt nur einfachen Aufforderungen nach.

Am 12. 1. 35: Tief benommen, schläft fast den ganzen Tag, nimmt nichts mehr zu sich. Gegen Abend tiefe, schnarchende Atmung. Unter Temperatursteigerung auf 40 Grad und einem Puls von 140 Schlägen in der Minute Exitus letalis.

d) Sektionsbefund.

(Pathol. Institut Jena, Professor Berblinger).

Bronchialkarzinom des rechten Lungenlappens mit Durchbruch in drei mittlere Bronchialäste. Stenose derselben und Erweiterung des peripheren Anteils. Bronchitis, Tracheitis, flächenhafte Verwachsungen der rechten Lunge, besonders über dem Zwerchfell. Verklebung über dem linken Oberlappen. Ausgedehnte Metastasen in der Leber und im Gehirn; sowohl in den Hirnhäuten als auch über der Convexität und im Hirnnern.

Cystitis, Balkenblase. Appendektomienarbe, reduzierter Ernährungszustand.

Schädel: Am Schädel sind äußerlich keinerlei Verletzungen zu sehen. Die Kopfschwarte läßt sich gut abziehen; das knöcherne Schädeldach hat die normale Dicke, die Dura läßt sich gut abziehen. Über der Convexität des Gehirns befinden sich regellos verstreut, blutig imbibierte oder blaurot verhärtete, scharf umschriebene Tumoren. Die weichen Hirnhäute sind ebenfalls mit verschiedenen, erbsengroßen, harten Tumoren bedeckt. Die Hirngefäße sind mit Blut gefüllt. Die Sinus sind frei von embolischen Verlagerungen. Schnitte durch Stirn- und Scheitellhirn ergeben auch im Inneren des Gehirns die oben beschriebenen Tumoren in regelloser Verteilung. Die Ventrikel sind nicht erweitert.

III. Epikrise.

Der Patient rutscht während der Arbeit ohne erkennliche Ursache beim Begehen einer Treppe aus und fällt nach hinten mit dem Rücken und Nacken auf eine Umfassungsmauer. Da der Sturz zunächst ohne Folgen bleibt — wir hören nichts

von einem Schädeltrauma — begibt sich der Patient wieder an seine Arbeit. Nach 2 Tagen stellen sich Kälteempfindungen und Gefühllosigkeit im rechten Arm ein, kurze Zeit danach Schwindelgefühl und Schläfenschmerzen. Diese nunmehr auftretenden Beschwerden führen den Patienten zum Arzt, der als einzigen äußeren Befund »Prellungen an der Rückseite rechts unterhalb des Rückgrates« feststellt. Ein Nervenspezialist, der wegen der Gefühlsstörungen am rechten Arm zugezogen wird, erhebt als weiteren objektiven Befund: geringe Sensibilitätsstörungen am rechten Arm, Fazialisparese links und Abweichen der Zunge nach derselben Seite. Er vermutet als Ursache dieser Störungen einen Hirntumor und rät zu weiterer spezialärztlicher Beobachtung.

Beim Versuch, diese Schädigungen im Zentralnervensystem zu lokalisieren, muß zunächst entschieden werden, ob es sich um periphere oder zentrale Nervenausfälle handelt. Die Schilderung des Unfallherganges zusammen mit dem objektiven Befund lassen mit Sicherheit auf eine zentrale Ursache schließen. Wir müssen annehmen, daß die Sensibilitätsstörungen in der linken Zentralwindung, die Fazialis- und Hypoglossusparesen in ihren Kerngebieten zu suchen sind, also multiple Herdsymptome im Gehirn bedeuten.

In den Tagen, die dem ersten Unfall folgten, übt der Patient trotz gestörten Allgemeinbefindens seinen Beruf aus, bis ihm nach 2 Wochen ein zweiter Unfall zustoßt. Diesmal überfällt ihn während der Arbeit ein »Ohnmachtsanfall«, und bei dem Versuch, sich schnell noch auf einen Stuhl zu setzen, fällt der Patient mit dem rechten Hinterkopf auf die Steinfliesen des Fußbodens. Nach diesem Sturz ist er längere Zeit bewußtlos, er erbricht, und aus Nase und Mund tritt Blut aus; starkes Schwindelgefühl zwingt ihn, das Bett zu hüten.

Im Gegensatz zum ersten »Unfall« kommt es diesmal zu schwereren »Unfallfolgen«. Am rechten Hinterkopf wird eine »große Geschwulst«, wahrscheinlich ein Haematom, festgestellt. Das linke Auge »sieht nach innen«, die Sprache »ist für kurze Zeit weg«, stellt sich aber unvollkommen wieder ein; es bleiben für die nächste Zeit gewisse Sprachschwierigkeiten zurück. Auch »wird er das Wasser nicht mehr los«, und Doppelbilder und Flimmern vor den Augen machen ihm Schwierigkeiten beim Sehen. Die Angabe, »die Gedanken gingen schwer«, lassen ferner darauf schließen, daß auch eine Erschwerung des Ablaufs der geistigen Vorgänge eintrat. — Soweit sein Bericht und der seiner Ehefrau.

Bei der Aufnahme in die hiesige Nervenklinik konnte folgender objektiver Befund erhoben werden:

Neben der Sensibilitätsstörung am rechten Arm und der Fazialisparese, beiderseitige Abducensparese, links mehr als rechts. Feinschlägiger Nyktismus und fast vollkommen lichtstarre Pupillen. Fehlen der Bauchdeckenreflexe, links angelegter Babinski, positiver Romberg und Blasenlähmung. Während Lunge und Herz ohne krankhaften Befund erscheinen, zeigt sich ein Puls von 56 Schlägen in der Minute bei einem RR von 130/90 mm Hg. Die Liquorpunktion ergibt 60 mm H₂O und starke Xanthochromie. Im Blutbild findet sich bei sonst normalen Verhältnissen eine geringe Erhöhung der Leukozyten auf 9400. Die Blutsenkungsgeschwindigkeit beträgt 16/32 nach Westergreen. Die Röntgen-Aufnahme des Schädels läßt keinen krankhaften Befund erkennen. Der Ernährungszustand ist reduziert.

Nach der von der Ehefrau angegebenen Vorgeschichte, dem vorstehenden Aufnahmebefund und dem weiteren Verlauf nahm die Klinik intracranielle Blutungen, eventuell mit Schädelbasisfraktur, an. Diese Diagnose wurde durch den Austritt von Blut aus Nase und Mund, den Liquorbefund mit starker Xanthochromie und den Druckpuls gestützt; der übrige negative Organbefund, neben dem psychisch benommenen Zustand des Patienten ließen sie als gesichert erscheinen.

In der Zeit zwischen dem zweiten Unfall und der Einlieferung in die Nervenklinik, die nahezu 4 Wochen beträgt, läßt sich keine wesentliche Besserung feststellen. Nach dem Auftreten der Ausfallerscheinungen bleibt das Zustandsbild stets das gleiche und veranlaßt schließlich die Angehörigen zur Überweisung in die Klinik. Hier stellt sich nach anfänglicher Besserung das typische Bild der amnestischen, später sensorischen Aphasie ein. Die Blasenlähmung verschwindet nicht. Es treten schließlich auch Schluckstörungen auf, und unter Lungenercheinungen und Vaguslähmung stirbt der Patient nach insgesamt 10-wöchiger Krankheit.

Die Sektion ergibt: neben Bronchitis, Tracheitis und flächenhaften Verwachsungen der rechten Lunge mit dem Zwerchfell und des linken Oberlappens mit der Pleura, ein Bronchialkarzinom des rechten Lungenlappens mit Durchbruch in drei mittlere Bronchialäste. Außerdem ausgedehnte Metastasen in der Leber, im Gehirn und dessen Häuten.

Da der Autopsiebefund die klinische Diagnose nicht bestätigt, drängt sich zunächst die Frage auf, ob es überhaupt möglich war, die Diagnose »Karzinom des Gehirns« schon bei

Lebzeiten des Patienten zu stellen. Nach dem anamnestischen Bericht des Kranken und seiner Frau, sowie nach den objektiven Befunden der Ärzte, die ihn vor seiner Aufnahme in die Klinik behandelten, steht fest, daß sich zwei dicht aufeinander folgende Ereignisse, sogenannte Unfälle, ereignet haben, und daß sich im Anschluß daran ein schweres, zum Tode führendes Krankheitsbild entwickelte. Es muß also unbedingt geklärt werden, ob die beiden »Unfälle« im ursächlichen Zusammenhang miteinander standen oder unabhängig voneinander eintraten, und, da es sich um eine gutachtliche Beurteilung handelt, ob diese beiden Ereignisse überhaupt Ursache der nachweisbaren Schädigungen sein können.

Der sogenannte erste Unfall konnte bei einem vollkommen gefunden Mann unmöglich so schwere und vielseitige Folgen nach sich gezogen haben, denn der Sturz nach hinten auf die Umfassungsmauer einer Treppe ohne erschwerende Momente — wir hören nichts davon, daß der Patient hoch heruntergestürzt ist, oder daß ihn ein schwerer Gegenstand etwa am Kopf getroffen hat — war für die Ursache der Nervenstörungen zu geringfügig, da ein direktes Schädeltrauma fehlte, durch das unter Umständen die Herdsymptome hätten erklärt werden können. Es ist anzunehmen, wenn das an sich harmlose Trauma mit den objektiv nachweisbaren Folgen in ursächlichen Zusammenhang gebracht werden soll, daß das Zentralnervensystem vorher schon irgendwie geschädigt war, ohne daß der Patient davon eine Ahnung hatte, und daß durch die vorläufig noch unbekannte Schädigung oder besondere Anlage des Zentralnervensystems ihrerseits überhaupt erst der sogenannte Unfall hervorgerufen worden ist.

Differentialdiagnostisch könnte zunächst in Erwägung gezogen werden, ob nicht eine primäre Gefäßschwäche vorliegt. Einflüsse toxischer Natur (Blei, Nikotin) sind anamnestisch auszuschließen; eine luische Schädigung ließ sich nach dem negativen Ausfall der WaR im Blut und Liquor mit größter Wahrscheinlichkeit auch verneinen. Schließlich bestand noch die Möglichkeit, daß der äußerst gracil gebaute, 44-jährige Mann, der den Krieg mitgemacht hatte, an einer beginnenden frühzeitigen Arteriosklerose litt, die eine traumatische Gefäßruptur begünstigt hätte. Der Folgezustand wäre dann der leichtesten Form eines apoplektischen Anfalls zu vergleichen, den der Patient über der Arbeit plötzlich erlitten hätte.

Allerdings wäre aus dem Prodromalstadium nichts bekannt: Erbrechen fehlte, wie es zuweilen beim Eintritt des Insults vorkommt; auch wird nach dem ersten Unfall ausdrücklich

betont, daß Bewußtlosigkeit nicht bestanden habe, daß ein komatöser Zustand mit fehlenden Reflexen, Pulsanomalien und Cheyne-Stokes'scher Atmung nicht beobachtet wurde. Dagegen hat es sich in unserem Falle nur um ein kurzdauerndes Schwindelgefühl, eine schnell vorübergehende Benommenheit, gehandelt. Die Herdsymptome, die sich 3 Tage später zeigten: Sensibilitätsstörungen im rechten Arm, Fazialisparese links, Abweichen der Zunge nach derselben Seite, außerdem Schläfen-schmerzen, Schwindel und Brechreiz, könnten demnach sehr wohl auf cerebrale Blutungen zurückzuführen sein. Doch wäre ihre vielseitige Lokalisation ein nicht gerade häufiger Befund bei Apoplexie. Vor allem fehlte beim ersten »Unfall« ein direktes Schädeltrauma, durch das vielleicht unfallmechanisch Blutungen und dadurch die Herdsymptome hätten erklärt werden können. Erst beim sogenannten zweiten Unfall, der 14 Tage später erfolgte und als »Ohnmachtsanfall«, also mit Bewußtseinsverlust, geschildert wird, überfiel den Patienten bei der Arbeit ein plötzliches Unwohlsein, bei dem er mit dem Hinterkopf auf Steinfliesen fiel. Diesmal trat retrograde Amnesie auf, dazu Erbrechen, Blasenlähmung und eine allgemeine Verschlimmerung des durch das erste Unfalleignis schon bestehenden Zustandsbildes. Äußerlich war als Befund eine Schwellung auf dem rechten Parietalhöcker zu erheben.

Nahmen wir an, daß sich der Patient nach dem ersten Sturz cerebrale Blutungen zugezogen hatte, so ist zunächst zu erörtern, ob vielleicht das zweite Zusammenbrechen als deren Folge aufzufassen wäre. Bekanntlich können noch nach einem Intervall von Tagen und Wochen an Stellen lokaler Gewebszertrümmerung, wie sie durch die angenommenen Hirnblutungen eingetreten sein konnten, bei geringstem äußeren Anlaß (psychische Erregung, körperliche Anstrengung) Gefäßrupturen eintreten. Die dadurch hervorgerufenen Blutungen wären dann stärker als beim ersten Mal gewesen; es wäre zum Insult, zur Bewußtlosigkeit gekommen.

Ein weiteres Symptom, das die Anfangsdiagnose »intracranielle Blutungen« stützen könnte, wäre der veränderte psychische Zustand des Patienten, der sich besonders nach dem zweiten »Unfall« zusammen mit den leichten amnestisch-aphasischen Störungen bemerkbar machte. Grund hierfür könnte der angenommene Insult sein, vielleicht auch eine diffuse Gehirnschädigung, als deren Folge Goldstein eine Herabsetzung der komplizierten Leistungen (Gedankenablauf, Sprache) sah, während die einfacheren noch erhalten sind. Bei den leichten Wortfindungsstörungen des Patienten wäre besonders

an diese Möglichkeit zu denken. Die Gesamtheit der Symptome wäre wohl für eine traumatische Hirn­schädigung auf Grund einer konstitutionell bedingten Gefäßschwäche zu verwerthen, aber unberücksichtigt ist dabei der Gefäßbefund des übrigen Körpers, der nirgends arteriosklerotische Veränderungen zeigte. Besonders ist der Blutdruck von 130/90 in diesem Alter durchaus als normal zu bezeichnen, während die geringfügige Albuminurie ohne Sedimentbefund im Sinne einer Hypertonie nicht verwertbar ist.

Die Möglichkeit der Annahme einer Schädelbasisfraktur, die zur retrograden Amnesie geführt hat, wäre als Ursache für die Erscheinungen nach dem sogenannten zweiten Unfall ebenfalls mit in Erwägung zu ziehen, da im Gegensatz zum sogenannten ersten Unfall tatsächlich ein Schädeltrauma erfolgte. Mir erscheint zwar auch das zweite Unfallereignis zu gering, um solche Folgen auslösen zu können, doch sprechen die Hirnnervenausfallerscheinungen, der Austritt von Blut aus Nase und Mund, die Xanthochromie des Liquors und der niedrige Puls von 56 Schlägen in der Minute für diese Annahme. Schwieriger ist schon in dieser Diagnose die immer bestehende Blasenstörung unterzubringen, denn eine traumatische Schädigung des Lendenmarks kann man unmöglich annehmen. Es wäre nur an eine zentrale Läsion in der Gegend der Zentralwindung zu denken, da man dorthin auch die Sensibilitätsstörungen des Armes verlegen müßte.

Die offensichtliche Besserung, die im Befinden des Patienten zunächst eintrat, sprach jedoch weiterhin für die Anfangsdiagnose: traumatisch entstandene Hirnblutungen. Auch der Nyctagmus und die Glykosemie, als Hirndrucksymptome gewertet, schwanden, sodaß der außerhalb der Klinik ausgesprochene Verdacht auf einen Kleinhirnbrückenwinkeltumor mit seinem nach dem heutigen Forschungsstand typischen klinischen Erscheinungsbild abgelehnt werden konnte.

Nach den Veröffentlichungen Carl Felix List's, die das umfangreiche Material Cushings behandeln, können wir die klinische Symptomatologie folgendermaßen einteilen:

1. Ein oberes Brückenwinkelsyndrom mit Beteiligung des Abducens und Trigeminus.
2. Das mittlere Syndrom mit Fazialis- und Acusticusbeteiligung.
3. Das untere Syndrom: Glossopharyngeus und Hypoglossus.

Eine weitere Gruppierung ergibt sich je nach dem, ob die cerebellaren, pontinen oder die Hirnerscheinungen das klinische

Bild beherrschen. Von Bedeutung ist ferner ein genauer Vestibularis- und Cochlearisbefund, da es sich bei den Kleinhirnbrückenwinkeltumoren gewöhnlich um Acusticusneurinome handeln wird.

Wenn auch wegen der Verschiedenartigkeit der Herdsymptome ein einziger Tumor abgelehnt werden konnte, so mußte die Mannigfaltigkeit der Ausfallerscheinungen zusammen mit den allgemeinen Hirnschädigungen auf multiple Neubildungen hinweisen, da sie neben der angenommenen Gefäßschwäche des Gehirns ebenfalls Ursache für die angeführten Erscheinungen sein konnten.

Auf die Möglichkeit ihrer Entstehung soll später eingegangen werden. Zunächst ist nur zu erörtern, ob die Symptome, welche die Diagnose »intracranielle Blutungen« auf Grund einer Schädelbasisfraktur stützen, auch durch Tumoren hervorgerufen werden konnten. Diese Annahme besteht durchaus zu Recht; sie müßten in unserem Falle dann besonders stark den Hirnstamm in Mitleidenschaft gezogen haben und durch Reizung des Vagus in seinen Kerngebieten den Puls von 56 Schlägen verursacht haben. Die Xanthochromie wäre auch ohne weiteres zu verstehen, wenn man berücksichtigt, daß durch das Wachstum der Tumoren Gefäße arrodiiert werden und Blutungen in die Hirnmasse und zwischen die Hirnhäute erfolgen.

Die Sektion ergab in unserem Fall eine diffuse Carcinose des Gehirns und seiner Häute, ausgehend von einem rechtsseitigen Bronchialcarcinom.

Sprachen nun nicht schon bei Lebzeiten irgend welche Symptome für diese Diagnose? Bei aufmerksamer Sichtung der gesamten Unterlagen scheinen mir mehrere Befunde wichtige Hinweise auf diese Erkrankungsmöglichkeit zu geben, denn sie lassen sich nicht in Einklang bringen mit der Diagnose »intracranielle Blutungen infolge Schädeltraumas«. Die Liquorpunktion ergab zwar Xanthochromie, sprach also für die angenommene Blutung, aber der erwartete Hirndruck, wofür der Puls deutlich sprach, ergab nur 60 mm. Nun ist die Punktion zwar nicht suboccipital, sondern lumbal vorgenommen worden, sodaß der geringe Liquordruck mit einer Verlegung des Foramen occipitale magnum durch die Kleinhirntonfalten zu erklären wäre. Dann hätte aber nach 4-wöchiger Dauer der Krankheit bestimmt eine Stauungspapille bestanden; sie fehlte aber während der gesamten Krankheit. Weiter erscheint mir die zweifellos erhöhte Blutflussgeschwindigkeit von 16/32 nicht genügend berücksichtigt worden zu sein. Denn abgesehen von den schlechten Zähnen konnte kein infektiöser Herd festgestellt

werden. Auch das Blutbild mit 9400 Leukocyten wird keine erhöhte Senkung hervorrufen, sodaß nach einer anderen Erklärung gesucht werden mußte, die ich in einer Globulin-erhöhung sehe, erzeugt durch die Abbauprodukte des Carcinoms.

Unbedingt verdächtig war auch der mäßige Ernährungszustand, der nicht die Folge der angenommenen Erkrankung sein konnte; heist es doch in der Anamnese: der Appetit des Patienten sei immer gut gewesen. Nach genauer Durchsicht des Sektionsprotokolls scheint der Lungenbefund der Krankengeschichte auch sehr unwahrscheinlich. Bei flächenhaften Verwachsungen der rechten Lunge mit dem Zwerchfell und Verklebungen über dem linken Oberlappen, muß auf jeden Fall die Verschieblichkeit der rechten Lunge eingeschränkt und zumindest auch das Atemgeräusch irgendwie verändert gewesen sein. Der hinfällige Zustand des Patienten mag den negativen Untersuchungsbefund erklären, aber eine Röntgen-Aufnahme der Lunge hätte vielleicht noch bei Lebzeiten des Patienten die Diagnose »Lungentumor« ermöglicht und einen Fingerzeig für das Leiden des Patienten gegeben.

Die Vorgeschichte nennt uns allerdings kein Ereignis, das auf einen malignen Tumor hinweisen könnte, obwohl all diese in dieser Richtung zu verwerten sind. Es sei denn, die »Kopfschmerz«, die den Patienten im Januar 1934 zum Arzt führte, fällt mit einer beginnenden Ausbreitung des Carcinoms in die Meningen zusammen. Die Metastasierung ins Gehirn hätte dann einen Verlauf genommen, wie er häufig beobachtet wird. Sie erfolgt auf dem Blutweg von dem primär erkrankten Organ aus oder, wie Jonas feststellen konnte, über die adventitiellen Lymphräume der Gefäße. Die Affektion der cerebralen Meningen ist dann entweder als direkte Fortleitung von zum Durchbruch gekommenen peripheren Hirnmetastasen (Miller, Siefert) aufzufassen, oder sie wird durch aufsteigende krebserregende Invasion über die Nervenscheiden der vorderen und hinteren Wurzeln erklärt werden müssen (Jonas). Sie bleibt lange Zeit ohne Erscheinungen, bis eine in die Krebsmetastasen erfolgte Blutung oder eine Erweichung in der Umgebung Reizsymptome und Lähmungserscheinungen hervorruft.

So berichtet Siefert einen Fall, bei dem ein 53-jähriger Landwirt, der bisher völlig gesund war, bei anstrengender Feldarbeit plötzlich das Bewußtsein verlor und hinfürzte. Somatische Folgeerscheinungen blieben zunächst aus. Kurze Zeit danach aber traten psychische Veränderungen auf, und die geistige Frische nahm ab. Bei der klinischen Aufnahme zeigten sich neben starker Gewichtsabnahme Fazialisparese, Zungen-

deviation, positiver Romberg und Blasenstörungen. Unter rasch fortschreitendem Verfall kam der Patient zum Exitus letalis. Die Sektion ergab ein Bronchialcarcinom mit Nieren- und Lebermetastasen. Dazu unregelmäßig verstreut in den Hemisphären, in den Vierhügeln und im Hirnstamm Metastasen mit teilweiser Erweichung. Das Rückenmark war in ähnlicher Weise befallen.

Auch dieser Fall zeigt ähnlich wie der zuerst geschilderte plötzlichen Beginn: bei ersterem hervorgerufen durch Blutungen, die durch die wachsenden Metastasen verursacht sind, bei letzterem wahrscheinlich durch toxische Zerfallsprodukte. Beide zeigen Kernlusionen und rasch zunehmenden körperlichen und geistigen Verfall. Leider ist im ersten Fall eine Sektion des Rückenmarks nicht erfolgt. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß gleich dem Siefert'schen Fall die Pyramidenbahnstörungen unseres Patienten auf ein Mitbefallensein des Rückenmarks zurückzuführen sind.

Bevor ein abschließendes Urteil über die Erkrankung abgegeben werden kann, muß man als Gutachter noch entscheiden, ob anzunehmen ist, daß der Unfall erst die Ansiedlung der Carcinomzellen hervorgerufen oder ermöglicht hat, wie Marburg berichtet, und ob der Unfall deswegen als wesentliche Teilursache zu berücksichtigen ist. Ich glaube, diese Möglichkeit ablehnen zu müssen. Allerdings sind nach dem Unfall typische Herdsymptome aufgetreten, wie das auch Marburg fordert, aber seine andere wichtige Bedingung für die traumatische Entstehung von Carcinomen ist nicht erfüllt, nämlich, daß das Trauma zumindest den Kopf trifft.

Überhaupt spricht die Regellosigkeit, mit der die gesamte Hirnsubstanz und die Hirnhäute ergriffen waren, gegen eine ursächliche traumatische Entstehung der Erkrankung. Auch die zweite Möglichkeit, daß der Unfall ein beschleunigtes Wachstum der Metastasen hervorgerufen hat, ist nach dem Zellaufbau der Tumoren abzulehnen, der keinen Anhalt für überstürztes, rasches Wachstum gibt. Gestützt wird diese Annahme noch dadurch, daß ich an allen größeren Metastasen mit Blutungen stets eine ältere und eine frische Blutung feststellen konnte, deren Ursache nicht die Unfälle, wohl aber die wachsenden Tumoren waren. Deshalb ist grundsätzlich abzulehnen, daß einer der »Unfälle« eine Verschlimmerung des durch das Bronchialcarcinom gesetzten Zustandsbildes bewirkt hat.

Meiner Ansicht nach ist der Krankheitsverlauf folgender gewesen: Der Patient litt an einem rechtsseitigen Bronchialcarcinom, das zur Metastasierung ins Gehirn und in die Leber

geführt hatte, ohne zunächst irgendwelche sichtbare Störungen hervorzurufen. Im latent kranken Gehirn waren nun infolge der stark erhöhten Empfindlichkeit Blutungen aufgetreten, für deren Entstehung zwei Möglichkeiten heranzuziehen sind. Erstens: sie können erfolgt sein, weil die Metastasen von sich aus gewachsen sind und dabei Gefäße arrodiiert haben. Dann wäre der sogenannte erste Unfall nur eine Folge der Blutung. Dieser Erklärung möchte ich mich anschließen. Zweitens: der geringfügige erste Unfall, bei dem nicht einmal der Schädel getroffen wurde, hat bei der ungemein hohen Empfindlichkeit des geschwulstkranken Gehirns gegen äußere Einwirkungen (Oppenheim) in den Metastasen zur Gefäßruptur geführt. Für den zweiten Unfall kommt wohl die zweite Möglichkeit in Frage, da hier ein wirkliches Schädeltrauma erfolgte, das heftig genug war — Bluterguß auf dem rechten Parietale — neben direkter, vielleicht auch durch Contre-coup-Wirkung die Blutungen hervorzurufen. Andererseits könnten auch Arrosionsblutungen angenommen werden, wenn der Vorgeschichte unbedingt Glauben zu schenken ist. Wir hören nämlich, daß dem zweiten Unfall ein Ohnmachtsanfall vorausging, der mit dem Eintritt der Blutung zusammenfallen könnte.

Am schwersten war der Hirnstamm betroffen. Das Gebiet der Occulomotorius-, Trigemini-, Fazialis- und Hypoglossuskerne auf beiden Seiten war von mehreren, bis kirschkerngroßen Metastasen durchsetzt, um die sich frische und ältere Blutungsherde, vor allem auf der linken Seite, befanden. Sie erstreckten sich teilweise bis über die Raphe hinaus und erklären die klinischen Symptome der Hirnnervenausfälle vollständig. Eine Lokalisation der anderen Schäden erübrigt sich infolge der Ausbreitung der Tumoren in sämtlichen Teilen des Gehirns. Auch in unserem Falle fehlen, wie häufig bei Metastasierung beschrieben, Hirndrucksymptome völlig, weil hierbei keine Verdrängung, sondern gewissermaßen ein Umbau von Hirnmasse stattgefunden hat.

Eine Erklärung für den unverhältnismäßig niedrigen Puls sehe ich in der Reizung des Vaguskernegebietes. An histologischen Schnitten habe ich in dieser Gegend eine sehr große Metastase mit einer alten und einer weit größeren frischen Blutung gefunden, die ich infolge ihrer zerstörenden Wirkung für die schließliche Todesursache halte. Der Exitus letalis erfolgte nämlich unter dem Zeichen der Vaguslähmung mit einem Puls von 140 Schlägen in der Minute.

Unser Urteil als Gutachter lautet also: Einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Unfall und Carcinose müssen wir ab-

lehnen, da die Erkrankung des Gehirns erst eine Folge des primären Bronchialcarcinoms gewesen ist. Die Metastasierung erfolgte nicht nach dem ersten Unfall und führte dann zu dem zweiten, sondern beide Unfälle sind die Folge von Blutungen in die Metastasen, die durch deren Wachstum entstanden sind. Vielleicht könnte beim sogenannten zweiten Unfall das Trauma als Ursache angenommen werden; beim sogenannten ersten Unfall mit Bestimmtheit nicht, denn dabei ist überhaupt kein Schädeltrauma erfolgt. Der Tod ist demnach nicht als Unfallfolge aufzufassen. Ferner ist auszuschließen, daß der Tod durch den Unfall beschleunigt herbeigeführt worden ist. Wenn ich auch annehme, daß eine Blutung in das Vaguszentrum den Tod endgültig herbeiführte, so ist diese Blutung sicher erst längere Zeit nach dem zweiten »Unfall« erfolgt, wie aus ihrem früh geronnenen Zustand zu erschließen ist, und demnach eine direkte Folge der wachsenden Metastasen.

IV. Schlußfolgerung.

Wie der angeführte Fall deutlich zeigt, ist es dringend erforderlich, daß der zur Unfallbegutachtung herangezogene Arzt sobald wie möglich eine genaue Untersuchung anstellt und zu einer klaren Diagnose kommt. Ohne Voreingenommenheit muß der gesamte Mensch so genau und vollkommen wie möglich untersucht werden. Auch Vergangenheit, Unfallhergang und akute Unfallfolgen müssen berücksichtigt werden, wobei vor einer Überschätzung subjektiver Angaben und einzelner Symptome zu warnen ist.

Ist eine genaue Diagnose nicht möglich, so muß der Gutachter wenigstens zu einer exakten diagnostischen Fragestellung kommen, um eventuell spezialärztliche Untersuchung veranlassen zu können. Vor allem aber muß der ersthinzugezogene Arzt, der auch stets das Anfangsgutachten abzugeben hat, bedenken, daß sein Gutachten für eine abschließende Beurteilung von großer Bedeutung ist, und daß er deshalb im Interesse einer gerechten Beurteilung seines Kranken jedes Versehen und jede Unachtsamkeit bei der Untersuchung vermeiden muß.

Lebenslauf.

Am 12. August 1910 wurde ich, Gerhard Paul Eduard Webendorfer, in Berlin-Steglitz als Sohn des Postinspektors Paul Webendorfer und seiner Ehefrau Luise geb. Ebert geboren. Nach Besuch der Vorschule in Schleiz/Thür. trat ich in das dortige Reformrealgymnasium ein, wo ich Ostern 1931 die Reifeprüfung ablegte. Ich widmete mich dem Studium der Medizin. Sechs Semester studierte ich in Jena, ein Semester in Berlin und siedelte anschließend wieder nach Jena über. Nach fünf vorklinischen Semestern legte ich die ärztliche Vorprüfung ab und meldete mich nach sechs klinischen Semestern zum Staatsexamen.

Literaturverzeichnis.

1. Bailey, Percival: Die Hirngegeschwülste.
2. Bannwarth: Zur Pathologie des Hirntumors. I. Mitteilung diagnostischer Irrtümer unter besonderer Berücksichtigung der Klinik der Schläfenlappen und Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. (Arch. f. Psych. u. Neurol. 103).
3. Coenen: Die Erkrankung des Gehirns, seiner Gefäße und Häute. (Lehrbuch der Chirurgie, Wullstein-Küttner).
4. Demme: Die Liquordiagnostik für Klinik und Praxis.
5. Engel: Die Beurteilung von Unfallfolgen.
6. Goldstein: Die Lokalisation in der Großhirnrinde. (Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie, 10. Band).
7. Göpel: Zur Diagnose der Hirntumoren (Inaugural-Differtation, München).
8. Hilpert: Über das metastatische Carcinom des Z. N. S. (Arch. f. Psychiatrie 77).
9. Jonas: Beitrag zur Klinik der Carcinome des Zentralnervensystems. (Inaugural-Differtation Jena 1925).
10. Lift, C. F.: Die Differentialdiagnose der Kleinhirnbrückenwinkelerkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Tumoren. (Zeitschr. f. gef. Neur. und Psych. 144).
11. Marburg: Unfall und Hirngegeschwulst.
12. Mendel: Der Unfall in der Aetiologie der Nervenkrankheiten.
13. Miller: Über einen Schleimkrebs des Rückenmarks. Zentralbl. f. Allgem. Pathologie u. Pathol. Anatomie, 28.
14. Oppenheim: Lehrbuch der Nervenkrankheiten, 7. Auflage.
15. Pfeifer: Psychische Störungen bei Hirntumoren.
16. Raecke: Psychiatrische Diagnostik.
17. Reichhardt: Einführung in die Unfallbegutachtung.
18. Rasdolsky: Dorsal-pontines Tumorsyndrom. (Zeitschr. f. d. gef. Neurol. u. Psych. 152).

